

عنوان روش اجرایی: نحوه مراقبت از بیمارانی که تحت آرامبخش متوسط و عمیق قرار گرفته اند	کد: Nurs 11
دامنه: بخش های بالینی	تاریخ آخرین بازنگری: ۹۵/۰۹/۲۵
	تاریخ ابلاغ: ۹۵/۱۰/۵

تعاریف واژه ها :

هدف: حفظ ایمنی بیماران در هنگامیکه آرام بخش دریافت نموده اند

شیوه انجام کار:

- ۱- متخصص بیهوشی - تکنسین بیهوشی پس از ورود بیمار به اتاق عمل و مانیتورینگ استاندارد بیمار و انتخاب روش آرامبخش متوسط و عمیق بر اساس نوع جراحی و شرایط بیمار به میزان مورد نیاز از داروهای لازم (مثال: آمپول میدازولام و آمپول فنتانیل) جهت آرامبخشی بیمار ، به بیمار تزریق می نمایند.
- ۲- متخصص بیهوشی و تکنسین بیهوشی در صورت نیاز مجدد بیمار به آرامبخش ، دوز لازم از داروهای مذکور را مجدداً تکرار میکند و تا بیدار شدن کامل ، بیمار مانیتورینگ شده و تکنیسین و متخصص بیهوشی در کنار بیمار حضور دارند.
- ۳- در پایان عمل در صورتی که بیمار شرایط خروج از اتاق جراحی را داشته باشد توسط تکنیسین بیهوشی و بیماربر بیمار به بخش ریکاوری منتقل میشود و تحویل مسئول ریکاوری می گردد.
- ۴- متخصص بیهوشی و تکنسین بیهوشی و پرستار ریکاوری با توجه به میزان داروهای دریافتی در اتاق عمل مانیتورینگ مناسب بیمار را در بخش ریکاوری انجام می دهد تا زمانی که بیمار شرایط خروج از ریکاوری به بخش مربوطه را داشته باشد.
- ۵- توسط تکنیسین بیهوشی گزارشات کامل در خصوص شرایط بیمار ساعت تزریق آرام بخش و ساعت بیدار شدن بیمار ثبت می گردد.
- ۶- متخصص بیهوشی نیز در برگ بیهوشی موارد لازم را ثبت می نماید.

امکانات و تسهیلات و کارکنان: پرستار ، متخصص بیهوشی ، بیماربر ، داروها و تجهیزات بیهوشی و برانکارد		
منابع: تجربه بیمارستان		
نام و سمت تهیه کنندگان: هاجر مسلمی / سرپرستار طاهره ملکی / سوپروایزر آموزشی عصمت حاج حسینی (سرپرستار اورژانس) مهديه نظری (سرپرستار جراحی) منصوره فارسی (سرپرستار اتاق عمل)	نام و سمت تایید کننده: طیبه سروی / مترون	نام و سمت تصویب کننده: دکتر علیرضا نظری / رئیس بیمارستان