

الگوی مصرف آنتی بیوتیک های پرکاربرد در بیمارستان مرادی

تعداد مصرفی

نام دارو	نیمه اول 94	نیمه دوم 94	نیمه اول 95
AMIKACIN Amp 500 mg	385	329	259
AMOXICILLIN Susp 250 mg	30	47	60
ampibactam Vial 2/1g	100	170	55
AMPICILLIN Vial 1 gr	204	179	426
CEFAZOLIN Vial 1 gr	1861	1710	2036
CEFAZOLIN Vial 500 mg	523	669	692
CEFEPIME Vial 1 gr	24	66	12
CEFTAZIDIME Vial 1 gr	22	0	49
ceftriaxon Vial 500 mg	73	47	49
CEFTRIAZONE Vial 1 gr	1553	1695	1369
CEPHALEXIN Capsule 500 mg	134	58	18
CIPROFLOXACIN Vial 200 mg	56	134	464
CLINDAMYCIN Amp. 300 mg	647	725	994
CLOXACILLIN SODIUM Vial 500 mg	489	337	150
IMIPENEME Vial 500 mg	8	12	8
Meropenem Vial 1 gr	5	24	2
MITOMYCIN Vial 2 mg	62	85	263
MUPIROCIN Topical Cream	3	4	1
PENICILLIN G POTASSIUM Vial 5000000	85	21	18
PENICILLIN G PROCAINE Vial 800000 U	1	8	18
PENICILLIN G SODIUM Amp. 5000000 units	318	310	344
TETRACYCLINE EYE OINT 1%	445	468	333
TETRACYCLINE Topical Ointment 3%	500	490	547
Gentamicin Amp 80 mg	869	1032	687
Vancomycin vial 500 mg	30	142	63
Metronidazole vial	157	113	136

تهیه کننده: فرامرز فرخ نیا مسئول امور دارویی بیمارستان مرادی

