



سازمان انتقال خون ایران

اداره کل انتقال خون استان کرمان

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

شماره: ۰۳/۹/۱۰۵۴/خ

پیوست:

بسمه تعالی

در تمام فصول اهداکننده خون باشیم

ریس محترم بیمارستان

اقدام اصلاحی اقدام مناسب حین بروز عارضه

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می‌رساند طبق بررسی فرم‌های گزارش عوارض ناخواسته احتمالی بعد از تزریق خون و فرآورده‌های خونی در مراکز درمانی در سال ۱۴۰۲؛ در رابطه با فرآیند تزریق موارد زیر مستلزم توجه و آموزش افراد زیربط است:

در هنگام بروز علائم و نشانه‌های دال بر عارضه می‌بایست تزریق فرآورده بلافاصله قطع گردد و پزشک بر بالین بیمار حضور پیدا کند و تمامی مستندات مرتبط با تزریق مجدداً کنترل شود. پس از بررسی شرایط بالینی بیمار و عارضه رخ داده تصمیم به ادامه یا قطع تزریق اتخاذ می‌شود.

شرایط توقف و شروع مجدد تزریق فرآورده‌های خونی به شرح زیر حضورتان ارسال می‌گردد:

- ۱- فاصله مناسب بین توقف و شروع مجدد تزریق نباید کمتر از ۳۰ دقیقه باشد.
- ۲- در زمان شروع مجدد تزریق سرعت تزریق باید کمتر باشد تا پایش بهتری روی بیمار انجام شود.
- ۳- مدت زمان فاصله بین شروع تا اتمام تزریق نباید بیش از ۴ ساعت شود. (شامل start ، restart ، فاصله بین start و restart)
- ۴- در این موارد اجازه شروع مجدد تزریق کیسه منجر به عارضه را داریم : راش ، کهیر(در مواردی که بسیار محدود باشد)
- ۵- در سایر موارد نباید تزریق کیسه منجر به عارضه ادامه یابد : احساس ناخوشی، سردرد، تب، تغییرات ضربان قلب، تغییرات فشار خون، بروز علائم تنفسی و ...

آدرس: بلوار ۲۲ بهمن، جنب شرکت گاز، اداره کل انتقال خون استان کرمان

تلفن گویا: ۳۲۳۰۰۱۵

فاکس: ۳۲۳۰۰۱۷

تلفن: ۳۲۳۰۷۱۲-۱۸

گواهینامه ISO 9001-2008

آدرس سایت: www.ibto.kr.ir

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

شماره: ۰۳/۹/۱۰۵۴/خ

پیوست:

سازمان انتقال خون ایران

اداره کل انتقال خون استان کرمان



سازمان انتقال خون ایران

دکتر ایرج شکوهی
مدیرکل

آدرس: بلوار ۲۲ بهمن، جنب شرکت گاز، اداره کل انتقال خون استان کرمان

تلفن: ۳۲۳۰۷۱۲-۱۸ فاکس: ۳۲۳۰۰۱۷ تلفن گویا: ۳۲۳۰۰۱۵

گواهینامه ISO 9001-2008

آدرس سایت: www.ibto.kr.ir